



여러분의 담당자가 성병  
및 생식기 질환에 대해  
안내를 해 드릴 것입니다.

# LOVE BUGS™



MARIE STOPES  
INTERNATIONAL

	박테리아 세균성 질염 여성에게만 해당.	귀두염 남성에게만 있음	클라미디아	방광염 여성에게만 해당.	성기 사마귀	임질	A형 간염	B형 간염	C형 간염	포진	HIV	비특정 요도염 남성에게만 해당	골반내 염증성 질환 (PID) 여성에게만 해당	사면발이	음	매독	아구창/ 칸디다*	트리코모나스증
성병/생식기 감염	때로는 BV 혹은 가드넬라라고함.	성기 귀두의 표피에 정상적으로 상주하고 있는 균의 과다 성장으로 귀두 표피에 염증이 생기는 질환.	남성성기, 자궁경부, 요도, 나팔관, 항문, 직장 그리고 드물게 후두 감염을 일으키는 박테리아성 감염.	방광내 염증을 일으키는 박테리아성 감염. 신장으로 전이 될 수 있으며 신장 기능에 손상을 줄 수 있음.	인유두종바이러스 (HPV) 감염	성기, 후두, 혹은 직장의 박테리아성 감염	간에 영향을 주는 바이러스성 감염	간에 영향을 주는 바이러스성 감염	간에 영향을 주는 바이러스성 감염	단순 포진 바이러스(HSV) 감염. 두 종류의 단순 포진 바이러스가 있음: 타입1은 주로 입술 주위에 나며 보통 입술 포진으로 알려짐. 타입 2는 보통 회음부나 항문 부위에 생김	HIV (인간 면역결핍 바이러스)는 면역 체계를 파괴하여 심한 감염과 암을 일으킬 수 있는 바이러스임. 에이즈 (후천성 면역 결핍증)는 HIV 감염의 말기 형태임.	남성 요도에 염증을 일으키는 박테리아 혹은 바이러스 감염.	감염이 여성 생식기의 상반부로 퍼져서 일어남 (자궁 경부, 자궁, 나팔관)	다른 몸부위와 성기 부위에서 발견되는 작은 기생충. 음모 및 신체 털에 기생.	피부에 파고드는 작은 진드기	박테리아 감염. 치료를 안하면 매우 심한 합병증이 생길 수 있음( 심장, 뇌 및 적수 손상).	회음부 혹은 후두의 점막을 자극하는 칸디다 효모균의 과다 성장으로 발생.	흔히 “트라이크 (세발자전거)”로 불리는 원충성 감염.
감염 경로	성접촉에 의한 감염이 아님. 질에 상주하고 있는 박테리아의 균형에 변화가 올 때, 즉 새로운 성관계 파트너 혹은 성행위 증가로 올 수 있음. 성활동이 없는 여성에게도 올 수 있음.	항상 성접촉을 통해 일어나는 것은 아님. 보통은 포경수술을 하지 않은 남성들에게 생기는데 포피가 따뜻하고 습기가 있어 균들이 잘 자랄 수 있기 때문. 수일 동안 씻지 않은 경우에 더 생기기 쉬움.	성접촉 혹은 손가락을 통해 성기에서 눈으로 전이됨. 증상은 접촉후 2주 내지 3 주후에 나타나지만 여러 해 동안 보이지 않을 수도 있음.	성병은 아니지만 성관계 후에 생길 수 있음. 박테리아가 항문에서 요도와 방광으로 전이되어 생기거나 혹은 방광을 적절히 씻지 않았을 때 생길 수 있음.	대개 보호되지 않은 성관계 시에 밀접한 피부 접촉에 의하여 전이됨. 때때로 바이러스의 전이 경로를 모를 수도 있음. 증상 재발 가능.	성접촉을 통해 감염됨. 치료를 하지 않을 경우 여성에게 골반내 염증성 질환을 일으킬수 있고 불임증이 여성과 남성에게 모두 발생할 수 있음. 증상은 감염된지 3일 내지 5일 후에 나타남.	성접촉을 통해 전이될 수도 있으나 좀 더 흔하게는 감염된 음식이나 물을 통해 혹은 화장실 사용 후나 음식을 만지기 전에 손을 씻지 않았을 때 전이됨.	성접촉을 통해 감염됨. 증상은 감염 후 4주 내지 6개월 뒤에 나타남. 아프리카, 아시아, 남 아메리카에서 매우 흔함	감염된 혈액을 통해 전이 (주사 바늘이나 주사기 등을 공유). 드물게 성접촉을 통해 전이됨	보호되지 않은 성관계를 포함하여 밀접한 피부 접촉에 의해 전이됨. 때때로 증상 없이 감염. 구강 성교 중에 입에서 성기로 전이될 수 있음. 접촉이 있는 후 3 일 내지 10일 뒤에 증상이 나타남.	성접촉으로 전이되며 수혈과 주사 바늘 등을 이용한 혈액을 통해서도 전이될 수 있음	보통은 성접촉으로 전이됨. 증상은 접촉후 2주가 지나 나타남.	이전에 걸린 성병 (클라미디아 혹은 임질 등)의 결과로 일어날 수 있으나 성병에 걸린 모든 환자가 골반내 염증성 질환을 연게 되는 것은 아님. 간혹 임신 중절 수술이나 다른 수술 후에 생기기도 함.	보통은 성교시 밀접한 신체 접촉으로 전이됨. 또한 감염된 사람과 침구와 옷을 함께 쓸 때도 전이 될 수 있음. 보통은 감염 후 여러 주가 지나서 증상이 나타날 수 있음.	항상 성접촉으로 전이되는 것은 아님. 피부접촉으로 전이. 또한 감염된 사람과 침구와 옷을 함께 쓸 때 전이될 수 있음. 감염된 후 4 주 후에 증상이 나타남.	성접촉으로 전이. 성접촉으로 전이. 증상은 접촉 후 1주 내지 4주 후에 발생.	성접촉으로 전이 되지는 않음. 균의 과다 성장의 원인으로는 항생제 사용, 면역력 저하, 당뇨병, 임신, 성교, 그리고/혹은 기후/음식 변화 등이 있음.	성접촉으로 전이 증상은 접촉 후 1주 내지 4주 후에 발생.
증상 (증상은 사람에 따라 다를 수 있음)	불쾌한 냄새 (성교 혹은 생리후에는 냄새가 더 심함) 와/혹은 회색/ 황색/녹색 분비물. 증상이 없을 수도 있음.	반점, 발진, 가려움증, 분비물, 성교 통증, 배뇨 곤란, 부종, 포피 염증.	많은 경우에 증상이 없음. 여성: 비정상적인 질 분비물, 성관계 및 배뇨 시 통증, 성관계 후 출혈, 부통. 남성: 성기 끝에 분비물, 배뇨시 통증, 치료를 하지 않을 경우 고환 통증과 부종	배뇨시 예리한 통증, 빈뇨, 혈뇨, 허리 하반부 혹은 복부에 통증, 그리고/혹은 발열	식별 가능한 사마귀/ 콜리플라워 같은 송이 (하나 혹은 여러 개) 가 회음부 (질/ 페니스) 그리고/ 혹은 항문에 생김. 가려울 수 있음.	여성: 황색이나 녹색의 질 분비물, 성교 통증, 부통, 배뇨시 예리한 통증. 50 퍼센트의 여성에게서 무증상. 남성: 성기에서 황색 분비물, 항문 염증/분비물, 고환 통증, 혹은 배뇨 통증. 대부분의 남성에게 증상이 있음.	질은 소변색, 경한 독감 증상, 구토, 복통, 피부 및 눈에 황색 현상. 흔히 증상이 없음.	독감 같은 증상, 질은 소변색, 미약한 장운동, 식욕상실, 야간 발한, 피부 및 눈에 황달 현상. 증상이 없을 수도 있음.	경한 독감 증상, 피로, 구역질, 복통, 질은 소변색, 피부나 눈에 황색 현상. 흔히 증상이 없음.	보통 회음부에 생긴 물집이 터져 포진, 배뇨통, 분비물 부종, 통증/염증을 남김. 처음 생겼을 때 증세가 가장 심하고 재발시에는 증상이 경감되고 기간도 짧음.	대부분의 환자들이 HIV 감염후 1주 내지 6주가 지나서 분비선 발열과 같은 증상을 보임 (발열, 발한, 설사, 홍진, 구강 궤양). 이런 증상이 머칠에서 몇주가 지속될 수 있음. 여러 경우에는 몇 년 동안 증상이 없음.	성기에 우유빛 고름 같은 분비물. 배뇨시 예리한 통증, 사정시 통증, 가려움, 간지러움, 성기 내부 자극, 골반 통증 그리고/혹은 고환 통증. 증상이 없는 경우도 있음.	증상이 항상 뚜렷한 것은 아님. 허복부 통증, 성교시 통증, 냄새나는 질 분비물, 불규칙한 출혈, 그리고/혹은 고열.	염증, 자극 그리고/혹은 치골 주위에 심한 가려움증.	가려움증, 특히 밤에는 몸의 이곳 저곳이 가려움 (머리와 등골 부위는 제외). 발진.	통상 회음부의 한곳에 통증이 없는 궤양이 생김. 사타구니 분비선 확대, 신체에 발진, 독감 같은 질환, 탈모. 중세가 없을 수도 있음.	여성: 외음부와 질의 가려움증, 통증과 찌릿함, 배뇨시 표면 통증, 근직하고 하얀/ 황색 분비물, 발진 및 부종, 성관계시 통증. 남성:보통 증상이 없음 - 때로는 배뇨 통증과 성기 분비물.	여성: 냄새나고 황색 거품이 나는 분비물. 질과 외음부의 가려움증과 통증, 성관계시 통증, 배뇨시 예리한 통증. 남성:보통 증상이 없음 - 때로는 배뇨 통증과 성기 분비물이 있음.
치료	항생제 정제 혹은 질에 바르는 크림 연고.	항진균 연고; 생리식염수 목욕; 따뜻한 비눗물로 씻기; 피부 관리 잘하기.	항생제 치료를 하지 않을 경우, 만성 통증 및 자궁의 임신 가능성 증가 혹은 불임까지 초래할 수 있는 골반내 염증성 질환 (PID) 이 생길 수 있음.	충분한 수분 섭취, 방광염 파우더 (Ural®)항생제 사용.	작은 사마귀는 나이트로젠 (에 일림), 다이아터미 (열을 가함), 혹은 화학물질을 발라서 제거할 수 있음. 사마귀 재발 위험이 있기 때문에 주로 및 변의 치료가 필요함.	항생제	알려진 치료법이 없음 - 장기간 의료 관찰이 요구됨. 최대 휴식과 적절한 수분섭취, 술과 약물을 피함. 예방접종 가능.	약물 치료가 어떤 보존자에게는 효과가 있을 수 있음. 만성 B형 간염을 가진 사람들은 장기간의 의료 관찰이 필요함. 알코올과 다른 약물을 삼가해야 됨. 예방접종 가능.	알려진 치료법이 없음 - 장기간의 의료 관찰이 요구됨. 휴식, 운동과 균형 있는 음식, 알코올과 약물 삼가. C형 간염을 위한 예방 백신은 없음. 현재 몇몇의 항생제 치료가 있음	포진처럼 경증인 경우는 연고 사용. 항바이러스 정제, 통증 완화를 위한 생리 식염수 목욕. 알려진 치료법이 없으므로 재발 가능. 감염증상이 처음 발견되었을 때부터 피부가 정상으로 돌아올 때 까지 성접촉을 피함	아직 알려진 치료법이 없음. 가장 효과적인 치료 형태는 HIV 를 직접 공격하는 항바이러스 복합 치료 요법	항생제.	항생제.	특수 로션/샴푸를 감염 부위에 바름. 옷과 침구는 반드시 세탁.	몸 전체에 바르는 특수 로션 과 가려움증을 가라앉히는 크림. 옷과 침구는 반드시 세탁.	항생제 주사.	항진균제 크림, 페서리 (질에 삽입) 혹은 생리 식염수 목욕. 심한 경우에는 구강 항균제 정제 (Diflucan®)	항생제

가장 흔한 성병의 전이 경로는 콘돔을 사용하지 않고 행하는 질, 항문 혹은 구강 성교입니다. 보호되지 않은 성관계를 했을 경우에는 간단한 검사를 하여 감염되지 않았다는 것을 확인하십시오.

어떤 성병 (예, 클라미디아)은 증상이 항상 나타나는 것은 아닙니다. 어떤 종류는 몇 년 동안이나 잠복해 있습니다. 감염을 체크하지 않고 놔두면 불임의 원인이 될 수 있는 골반내 염증성 질환이 생길 수 있습니다. 그러므로 뚜렷한 증상이 없더라도 결코 병에 걸리지 않았다고 생각하지 마십시오. 반면에 가려움증이 생겼다고 해서 꼭 성병에 걸렸다고 할 수는 없습니다.

사람에 따라서 증상이 다양하므로 성건강을 확실시키기 위하여 마리 스톱스 인터내셔널 센터 (Marie Stopes International centre)나 지역의 가족계획 클리닉 혹은 의사를 찾아가서 검진을 받는 것이 좋습니다.

다음 사항을 기억하십시오.

- 현재의 파트너들이 모두 동시에 같은 치료를 받는 것이 매우 중요합니다. 그렇게 하지 않으면 파트너 간에 계속해서 감염을 주고 받을 수 있습니다. 또한 감염의 위험이 있는 과거의 모든 파트너들도 검진받고 치료받아야 합니다.
- 콘돔만이 성병과 계획하지 않은 임신으로부터 모두 보호해 줍니다.
- 여성들은 정기 유방 검진을 잊지 마십시오. 그리고 매 2 년마다 자궁경부세포진검사 (pap smear)를 꼭 받으십시오.
- 남성들은 정기적인 고환 검진을 잊지 마십시오.

호주 수도권, 퀸즐랜드 주, 뉴사우스웨일즈 주, 빅토리아 주, 그리고 웨스턴 오스트렐리아 주에 각각 위치해 있는 마리 스톱스 인터내셔널 (Marie Stopes International) 센터에서는 다음 사항을 포함한 성건강과 생식기 건강 관리 전문의 서비스를 제공합니다.

- 낙태 및 사후 관리
- 수술전 의료상담을 포함한 정관절제술, 10분 내지 15 분간의 무도 정관수술, 정액 검사 및 수술후 관리
- IUD, Implanon®, NuvaRing® and Depo Provera® 을 포함한 삽입 및 피임법 조언
- 성병 검진
- 진료 상담
- 질경검사 (선정된 센터에서)

Marie Stopes International에서는 모든 고객이 판단받지 않고 개별적이며 비밀이 보장된 방법으로 즉각적인 도움과 지원을 받도록 하고 있습니다. 대기자 명단이 없으며 유동성있는 진료 시간과 Medicare 환불이 가능합니다. 저희 센터는 편안하면서 최상의 임상 기준을 갖춘 비입원 환경을 제공하고 있습니다.

가까운 센터의 서비스에 대한 더 자세한 정보를 원하시거나 혹은 예약을 하시려면 National Support Centre (국내 지원 센터)에 다음 전화번호로 연락해 주십시오.

가까운 센터의 서비스에 대한 더 자세한 정보를 원하시거나 혹은 예약을 하시려면 National Support Centre (국내 지원 센터)에 다음 전화번호로 연락해 주십시오.

**무료 통화 1800 003 707 (24 시간 대기)**

혹은 다음 웹사이트를 방문해 주십시오

**[www.mariestopes.com.au](http://www.mariestopes.com.au)**

언어지원을 위해서는 TIS (번역통역 서비스)에 **131 450**으로 전화하십시오.



**MARIE STOPES  
INTERNATIONAL**

Marie Stopes International은 저희 고객에게 최상의 서비스를 제공하는 것이 목표이며 고객의 의견은 우리에게 매우 중요합니다. 저희의 정보에 대해 혹은 기타 저희의 서비스에 대해 개선점을 제안하길 원하실 경우, 센터에서 제공한 고객 의견서를 작성하시거나 Marie Stopes International 팀 멤버에게 이야기하십시오. Marie Stopes International에서 제공한 서비스 중에서 만족하지 않으시는 것이 있거나 공식적인 불만신고를 하길 원하실 경우에는 센터 매니저가 귀하의 불만신고를 긴급사항으로 다루어 조사를 실시할 것이며 귀하에게 답변을 제공할 것입니다. 귀하의 불만신고를 처리하는 것에 만족하지 않으실 경우 귀하의 불만신고는 CEO - Australia에 의뢰될 것입니다.

© 2007 Marie Stopes International. 저작권은 Marie Stopes International이 소유하고 있습니다. 이 발행물의 복제는 저자의 사전 동의 없이는 엄격히 금지됩니다.